

VIETNAMESE – CHOKING PREVENTION

An toàn tại nhà và phòng chống thương tích



Phòng ngừa bị nghẹn

- Cẩn thận với đồ ăn có thể làm trẻ bị nghẹn, ví dụ: kẹo dẻo, bỏng ngô/bắp rang, táo, thịt và các loại hạt.
- Những đồ vật có kích cỡ nhỏ hơn pin cỡ D có thể làm trẻ dưới 3 tuổi bị nghẹn.
- Khuyến khích trẻ ngồi yên và không ăn vội vàng. Trông chừng trẻ trong suốt thời gian ăn.
- Thường xuyên kiểm tra đồ chơi để phát hiện những bộ phận bị lỏng.
- Các loại pin tiểu hình cúc áo đặc biệt nguy hiểm. Nếu quý vị nghĩ là con mình đã nuốt phải loại pin này, hãy ngay lập tức đưa trẻ đến Khoa Cấp cứu. Đừng tìm cách cho trẻ nôn ra.



Education
and Training

Thông tin Cộng đồng Bệnh viện Royal Children's Hospital

Điện thoại +61 3 9345 5085 www.rch.org.au

Tài liệu này được soạn thảo bởi The Royal Children's Hospital với sự chấp thuận của Department of Education and Training.