

Date Received Вакцинація отримана ____ / ____ / 20__ Time Given Даний час: _____

(Будь ласка зачекайте мінімум 15 хвилин після вакцинації)

Позначте місця ін'єкцій, обвівши відповідне поле: LA = Left Arm, RA = Right Arm, LL = Left Leg, RL = Right Leg

ЛР-ліва рука, ПР-права рука, ЛН-ліва нога, ПН-права нога

<p>Ротавірусна вакцина (Rotarix®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p> <p>* Вакцинний вірус може бути виділений в калі, особливо після першої дози. Миття рук важливо після кожного зміна підгузників.</p> <p>* Інвагінація</p> <p>– Див. 'Рідкісні реакції'</p>	<p>Дифтерія, Правець, Коклюш, Поліомієліт, Гепатит В, Haemophilus influenzae типу b (Infanrix® hexa)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p>	<p>Пневмококова вакцина (Prevenar 13®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p>	<p>Вакцина проти Менінгококу ACWY (Nimenrix®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p>
BY MOUTH/Ротом	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР
<p>Вакцина проти гемофілної палички типу b (ActHIB®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p>	<p>Вакцина проти дифтерії, правця, коклюшу Діти (Infanrix® or Tripacel®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p> <p>* Дуже рідко, велика реакція у місці ін'єкції (>50 mm) в т.ч. може виникнути набряк кінцівки у дітей (з 4ю або 5ю дозою вакцини, що містить правець). Ці реакції зазвичай починаються протягом 24–72 годин після вакцинації, і вирішуються спонтанно всередині 3-5 днів. Якщо ця реакція виходить за межі одного або обох суглобів, зверніться до лікаря.</p>	<p>Вакцина проти Кору, паротиту (свинка), краснухи, вітряної віспи (Priorix-Tetra® or ProQuad®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p> <p>* Реакції, які можуть бути присутні через 7-10 після вакцинації:</p> <ul style="list-style-type: none"> – лихоманка понад 39оС – висип (не інфекційний) – симптоми простуди, насморк, кашель, набряк очей – набряк в області шиї /під підборіддям. <p>* Реакції 5–26 днів після вакцинації:</p> <ul style="list-style-type: none"> – легкий висип, схожий на вітряну віспу (може бути заразним, шукати медичну консультацію). 	<p>Вакцина проти кору, паротиту, краснухи (MMRII® or Priorix®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p> <p>* Реакції, які можуть бути присутні через 7-10 після вакцинації:</p> <ul style="list-style-type: none"> – лихоманка понад 39оС – висип (не інфекційний) – симптоми простуди, насморк, кашель, набряк очей – набряк в області шиї /під підборіддям.
LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР
<p>Вакцина проти дифтерії, правця, кашлюку (Infanrix® IPV or Quadracel®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p> <p>* Реакція на великому місці ін'єкції - почервоніння і набряклість від плеча до ліктя. Якщо ця реакція поширюється за межі одного або обох суглобів, звернутися за медичною допомогою.</p>	<p>Вакцина проти Гепатиту В (H-B-Vax® II Paediatric or Engerix® B Paediatric)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p>	<p>Вакцина проти поліомієліту (Polio vaccine)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p>	<p>вітряна віспа (Varicella)</p> <p>Приблизно через 7-10 днів після вакцинації:</p> <ul style="list-style-type: none"> * лихоманка (може бути >39 °С) <p>Приблизно через 5-26 днів після вакцинації:</p> <ul style="list-style-type: none"> * лихоманка * легкий висип, схожий на вітряну віспу.
LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР
<p>Грип (Influenza)</p> <p>* болі в м'язах.</p>	<p>вакцина проти вірусу папіломи людини (HPV) (Gardasil®9)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p> <ul style="list-style-type: none"> * Легкий головний біль * Легка нудота 	<p>Вакцина для дорослих проти дифтерії, правця, кашлюку, (Boostrix® or Adacel®)</p> <p>* Див. 'Поширені реакції'</p>	
LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР	LL/ЛН RL/ПН LA/ЛР RA/ПР